

HEMOVIGILANCE

Catherine HENRY, Aurélie ROYER ,
Cadres de Santé,

Réanimation chirurgicale – SSPI,
Groupe hospitalier Bicêtre, Brousse,
Béclère



RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

- ◆ Décret des actes professionnels,
Code de la Santé Publique
- ◆ Loi du 4 mars 2002 relatif aux
malades et à la qualité du système
de santé

LES PROGRES

- ◆ Taux de traçabilité en juillet août 2008 entre 65 et 80%
- ◆ Aujourd'hui, taux de traçabilité des PSL de plus de 98%



MODE DE STOCKAGE

- ◆ Les CPA ET LES PFC se transfusent immédiatement après leur réception (il est interdit de les conserver au réfrigérateur). La transfusion doit durer moins de 30 min
- ◆ Les CG se transfusent dans les 2h à partir du moment de la réception (6h dans réfrigérateur de banque du sang)
- ◆ SI IMPOSSIBILITE de transfuser les produits à leur réception, prévenir la transfusion et leur retourner rapidement les produits

VERIFICATION

◆ A la réception du produit :

- ◆ concordance du produit avec la prescription, identité du patient et de la fiche d'attribution, vérification de l'aspect du produit, vérification de la date de péremption, si les RAI sont positives vérification phénotype sur la poche avec anticorps irrégulier mentionné

◆ Au lit du patient :

Vérifier identité du patient par l'IDE qui transfuse, CPTU

BRANCHEMENT

◆ Voie unique

◆ Tubulure spécifique à sang

◆ Remplir le réservoir jusqu'en haut du filtre

SURVEILLANCE TRANSFUSIONNELLE

- ◆ L'infirmière doit rester vigilante
- ◆ Les alarmes doivent être adaptées
- ◆ Prise de la température pré, per et post-transfusionnelle.



SIGNES D'ALERTE

- ◆ Frisson,
- ◆ Hyperthermie
- ◆ Hypo-hypertension
- ◆ Douleur lombaire
- ◆ Rétention urinaire
- ◆ Saignement en nappe au point de ponction et sur les autres plaies chirurgicales
- ◆ Céphalées, troubles de la conscience

CONDUITE A TENIR

- ◆ Arrêt de la transfusion
- ◆ Conserver la voie veineuse
- ◆ Appel du réanimateur
- ◆ Appel de la transfusion
- ◆ Rédiger fiche d'alerte qui sera transmise à l'ETS
- ◆ Prélèvements sur avis médicale, ne pas prélever sur la poche

TRACABILITE

◆ Garder les poches 12h au réfrigérateur

◆ Remplir les fiches



CONCLUSION

- ◆ L'hémovigilance est un des signes majeur de la qualité des soins dans un service

